OPUSCOLI-VIDEO-ADV

DOLORE CRONICO

ANTIBIOTICI

CARDIO PAIN

LINEA ACC

VIDEO

Video	Link	QR
INN	SANDOZ - INN	
CARDIO	SANDOZ - Cardiovascular Area	
PAIN	SANDOZ - Pain Area	
DIOSMINA	SANDOZ - Diosmina	
ACC	SANDOZ - ACC	
MAGNESIO POTASSIO	SANDOZ - Magnesio Potassio	

IBUPROFENE	SANDOZ - Ibuprofene	
LATTULOSIO	SANDOZ - Lattulosio	
PARACETAMOLO	SANDOZ - Paracetamolo	

Medicinale n.1 nelle vendite tra i prodotti per la tosse in Europa nel 2023

ACC®

Un alleato contro TOSSE e MUCO, con AZIONE ANTIOSSIDANTE.

SANDOZ

*Nicholas Hall's global CHC database, DB6, MAT Q4 2023.

È un medicinale a base di acetilcisteina. Non somministrare a bambini al di sotto dei 2 anni. Leggere attentamente il foglio illustrativo. IT2407189377. Autorizzazione del 17/09/2024.

ACC ADV 20x25cm M6.pdf 1 20/11/23 08:53

ACC®

Un alleato contro TOSSE e MUCO, CON AZIONE ANTIOSSIDANTE.

SANDOZ

È un medicinale a base di acetilcisteina. Non somministrare a bambini al di sotto dei 2 anni.
Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 29/09/2023.

IT2308013098

La prevenzione, l'anticipazione d'uso e la giusta terapia sono fondamentali per il raggiungimento dei target terapeutici per le malattie cardiovascolari.

Sandoz è al tuo fianco con un portfolio di farmaci a combinazione fissa.

Fai una Scelta di Salute

SANDOZ

Codice aziendale IT2409277686

SANDOZ

E tu, sai cosa si prova?
Superare il dolore si può.

1 persona su 5 soffre di dolore cronico.
Non sottovalutare il dolore e rivolgiti al tuo medico.
Fai una scelta di salute.

Scopri di più su:
www.sandoz.it

Campagna realizzata con il patrocinio di:

Associazione Italiana per lo Studio del Dolore AISD
Cittadinanzattiva
federDolore Società Italiana dei clinici del Dolore
fondazione ISAL Ricerca sul dolore
Fondazione onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere
SIMG Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie

IT2403156757

Ibuprofene Sandoz®

Azione

contro dolore
e mal di testa

SANDOZ

È un medicinale a base di ibuprofene che può avere effetti indesiderati anche gravi.
Non somministrare a bambini al di sotto dei 12 anni.
Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 12/03/2024

IT2312040771

Magnesio Potassio Sandoz®

RI-CARICA le tue Energie

Il magnesio contribuisce alla riduzione di affaticamento e stanchezza, il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, per reintegrare le tue energie, quando ne hai più bisogno.

SANDOZ

IT2305094963/A

Con il sistema cardiocircolatorio non si è mai troppo prudenti.

Sapevi che le malattie cardiovascolari, come ipertensione e ipercolesterolemia, colpiscono ogni anno più di 18 milioni di persone nel mondo? Con la giusta terapia è possibile ridurre il rischio di complicazioni.

Fai una scelta di salute con Sandoz.

SANDOZ

IT2205203341/A

Sentiti leggera ad ogni passo

Diosmina Sandoz®

Diosmina Sandoz è un integratore alimentare.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata.

SANDOZ

CODICE DEPOSITO AZIENDALE IT2405221762

SANDOZ

IT2206011385/A

Lattulosio Sandoz®

Per *Riattivare* il tuo intestino



SANDOZ

È un medicinale a base di lattulosio. Somministrare ai bambini al di sotto dei 12 anni solo dopo aver consultato il medico. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 02/04/2024

IT2312133833

SANDOZ

IT2205267371/A

Paracetamolo Sandoz®

Allevia

febbre e dolore

SANDOZ

È un medicinale a base di paracetamolo. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare a bambini al di sotto dei 9 anni. Autorizzazione del 05/04/2024

IT2312133842

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Ancilleg 10 mg/10 mg capsule rigide
Ancilleg 10 mg/20 mg capsule rigide
Ancilleg 10 mg/40 mg capsule rigide

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ancilleg 10 mg/10 mg capsule rigide
Ogni capsula rigida contiene 10 mg di ezetimibe e 10 mg di atorvastatina (come atorvastatina calcio triidrato).

Ancilleg 10 mg/20 mg capsule rigide
Ogni capsula rigida contiene 10 mg di ezetimibe e 20 mg di atorvastatina (come atorvastatina calcio triidrato).

Ancilleg 10 mg/40 mg capsule rigide
Ogni capsula rigida contiene 10 mg di ezetimibe e 40 mg di atorvastatina (come atorvastatina calcio triidrato).

Eccipiente(i) con effetti noti
Ogni capsula di Ancilleg 10 mg/10 mg contiene 13 mg di saccarosio.
Ogni capsula di Ancilleg 10 mg/20 mg contiene 26 mg di saccarosio.
Ogni capsula di Ancilleg 10 mg/40 mg contiene 51.5 mg di saccarosio.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Capsule rigide

Ancilleg 10mg/10mg capsule rigide:
Capsula di gelatina rigida con chiusura non contrassegnata di dimensione 0, con testa di colore caramello e corpo di colore giallo, riempita con pellets e una compressa. La lunghezza della capsula è di circa 21.7 mm.

Ancilleg 10mg/20mg capsule rigide:
Capsula di gelatina rigida con chiusura non contrassegnata di dimensione 0, con testa di colore marrone rossastro e corpo di colore giallo, riempita con pellets e una compressa. La lunghezza della capsula è di circa 21.7 mm.

Ancilleg 10mg/40mg capsule rigide:
Capsula di gelatina rigida con chiusura non contrassegnata di dimensione 0, con testa di colore marrone scuro e corpo di colore giallo, riempita con pellets e una compressa. La lunghezza della capsula è di circa 21.7 mm.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Le capsule rigide di Ancilleg sono indicate in aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva in pazienti adulti per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria, incluso l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipidemia combinata (mista), già adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati insieme con lo stesso dosaggio dell'associazione a dose fissa, ma come medicinali diversi.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

DIPPERAM®
Amlodipina/valsartan

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Denominazione del medicinale
Dipperam 5 mg/80 mg compresse rivestite con film
Dipperam 5 mg/160 mg compresse rivestite con film
Dipperam 10 mg/160 mg compresse rivestite con film

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato) e 80 mg di valsartan.
Ogni compressa rivestita con film contiene 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato) e 160 mg di valsartan.
Ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di amlodipina (come amlodipina besilato) e 160 mg di valsartan.
Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Compressa rivestita con film

5 mg/80 mg compresse rivestite con film
Compressa rivestita con film di colore giallo scuro, rotonda con bordi smussati, con impresso "NVR" su un lato e "NV" sul lato opposto.
Dimensioni approssimative: diametro 8,20 mm

5 mg/160 mg compresse rivestite con film
Compressa rivestita con film di colore giallo scuro, ovale, con bordi smussati con impresso "NVR" su un lato e "ECE" sul lato opposto.
Dimensioni approssimative: 14,2 mm (lunghezza) x 5,7 mm (larghezza)

10 mg/160 mg compresse rivestite con film
Compressa rivestita con film di colore giallo chiaro, ovale, con bordi smussati con impresso "NVR" su un lato e "UIC" sul lato opposto.
Dimensioni approssimative: 14,2 mm (lunghezza) x 5,7 mm (larghezza)

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento dell'ipertensione essenziale.
Dipperam è indicato negli adulti nei quali la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata da amlodipina o valsartan in monoterapia.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
La dose raccomandata di Dipperam è una compressa al giorno.

Dipperam 5 mg/80 mg può essere somministrato a pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con 5 mg di amlodipina o 80 mg di valsartan da soli.

Dipperam 5 mg/160 mg può essere somministrato a pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con 5 mg di amlodipina o 160 mg di valsartan da soli.

Dipperam 10 mg/160 mg può essere somministrato a pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con 10 mg di amlodipina o 160 mg di valsartan da soli o con Dipperam 5 mg/160 mg.

Dipperam può essere preso con o senza cibo.

Si raccomanda la titolazione individuale dei due componenti (amlodipina e valsartan) prima di passare all'associazione fissa. Se clinicamente appropriato, può essere considerato il passaggio diretto dalla monoterapia all'associazione fissa. Per i pazienti che assumono compresse/capsule separate di valsartan e amlodipina, può essere conveniente passare a Dipperam contenente le stesse dosi di componenti.

Compromissione della funzionalità renale
Non sono disponibili dati clinici in pazienti con compromissione renale grave. Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione della funzionalità renale lieve o moderata. In caso di moderata compromissione della funzionalità renale, si consiglia il controllo dei livelli di potassio e di creatinina.

Compromissione della funzionalità epatica
Dipperam è controindicato nei pazienti con grave compromissione della funzionalità epatica (vedere paragrafo 4.3).

Dipperam deve essere somministrato con cautela a pazienti con compromissione della funzionalità epatica o con disturbi da ostruzione biliare (vedere paragrafo 4.4). Nei pazienti con compromissione lieve o moderata della funzionalità epatica, senza colestasi, la dose di valsartan non deve superare gli 80 mg. Non sono stati stabiliti dosaggi specifici di amlodipina per pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. Quando i pazienti ipertesi con compromissione epatica eleggibili sono trasferiti al trattamento con amlodipina o con Dipperam (vedere paragrafo 4.1), deve essere usata la dose disponibile più bassa di amlodipina come monoterapia o di amlodipina come componente dell'associazione fissa, rispettivamente.

Anziani (65 anni di età ed oltre)
Quando si aumenta la dose nei pazienti anziani è necessaria cautela. Quando i pazienti ipertesi anziani eleggibili sono trasferiti al trattamento con amlodipina o con Dipperam (vedere paragrafo 4.1), deve essere usata la dose disponibile più bassa di amlodipina come monoterapia o di amlodipina come componente dell'associazione fissa, rispettivamente.

Popolazione pediatrica
La sicurezza e l'efficacia di Dipperam nei bambini di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Modo di somministrazione
Uso orale.
Si raccomanda di prendere Dipperam con un po' d'acqua.

4.3 Controindicazioni
- Ipersensibilità ai principi attivi, ai derivati diidropiridinici,